

Pigfast® SOLUTION

ALIMENT COMPLEMENTAIRE

Principaux éléments : Vinaigre de cidre de pommes issu de l'agriculture biologique, Sulfate de sodium, Mélasse de bois (contenant du châtaignier), Chlorure de sodium, eau de source.

ADDITIFS : Substances aromatiques : mélanges de substances aromatiques

ADDITIFS teneurs au litre

3b103 Fer (sulfate de fer (II) monohydraté)	5050 mg
3b503 manganèse (sulfate monohydraté de Mn)	38 mg
3b405 cuivre (sulfate de cu (II) pentahydraté)	35 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité	96%
Cendres brutes	0,7%
Protéines brutes	traces
Matière grasse brute	1,2%
Cellulose brute	traces
Sodium	0,1%
Lysine	0,0%
Méthionine	0,0%

*** Ne pas utiliser PIGFAST®
et DINAMYCOL® le même jour.**

- Aspect : Maron-Noir
- Odeur : caractéristique de plantes
- Densité: 995 / litre ± 10 gr
- Objectifs : Favorise l'assimilation alimentaire et les performances zootechniques des animaux.

Sur les truies qui ont une consommation anormalement haute par rapport à la moyenne, ce qui pourrait exprimer une mauvaise préemption des nutriments dû à un manque de métabolisme du bol alimentaire.

Permet des porcelets plus homogènes et plus lourds à la naissance.

Dans les épisodes de diarrhées du porcelet au sevrage, sur des porcs à l'entrée en engraissement si ceux-ci peinent dans les dix premiers jours et/ou entre 110 et 115 jours d'âge pour prévenir la cassure de croissance, **PIGFAST®** relance l'appétit et la croissance.

Action sur les biofilms des réseaux eau et machine à soupe dans le cadre de notre protocole réseaux **DINAMYCOL®** suivi de **PIGFAST®** (Université de Bretagne Sud) : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631074815002635>.

- Mode d'utilisation : en incorporation à l'eau de boisson ou à la ration alimentaire des porcs,
 - Truie : 50 à 60 ml / truie dans 3 repas espacés de 8 à 12 heures
 - Porcelets : 1 ml / porcelet / jour les deux jours qui précèdent le sevrage et 3 à 5 jours qui suivent le sevrage, puis 1 à 2 ml / Porcelets / jours du 42ème au 45ème jour de vie.
 - Engraissement : Dès l'entrée en engraissement 5ml / Porcs / repas espacé de 8 à 12h sur 3 repas.
 - Puis 7 à 10ml par porc par repas entre le 110ème et le 115ème jour dans 3 à 5 repas espacés de 12h
 - Volailles : 10 premiers jours 1,5 litre pour mille litres dans l'eau de boisson.

- Précaution d'utilisation : pour les canalisations préférer de le faire pendant le vide sanitaire des salles
- Présentations : Bidons de 1L, 5L, 20L.
- Péréemption : 2 ans maximum après la date de fabrication indiquée sur le fond des bidons.
- Stockage : dans un endroit sec et aéré, à l'abri de la lumière solaire directe, à une température comprise entre 1° et 40°.

*** PIGFAST® ne dispense pas de l'utilisation d'antibiotiques si ceux-ci sont nécessaires et préconisés par le vétérinaire chargé du suivi sanitaire de l'élevage.** Version Janvier 2021